

Стратификация риска ВТЭ в гинекологии  
 Модель оценки риска Caprini

Дата: Текущая дата

ФИО пациента: Фамилия И.О.

Сумма баллов:

Профилактика: профилактика

Сумма баллов	Уровень риска	Режим профилактики
0-1	низкий риск	ранняя активация
2	умеренный	немедикаментозные методы профилактики и/ или применение антикоагулянтов
3-4	высокий	применение антикоагулянтов ( сочетание с немедикаментозными методами)
5 и более	очень высокий	применение антикоагулянтов

1 балл	2 балла	3 балла	5 баллов
Возраст 41- 60 лет	Возраст 61-74 лет	Возраст больше 75 лет	Инсульт ( меньше 1 мес)
Малая хирургия	Артроскопическая хирургия	ВТЭО в анамнезе	Элективная артропластика (эндопротезирование крупных суставов)
Индекс массы тела больше 25 кг/ м2	Крупная открытая хирургия (больше 45 мин)	Семейный анамнез ВТЭО	Перелом бедра, костей таза или голени (менее 1 мес)
Отеки нижних конечностей в настоящий момент	Лапароскопическая хирургия (больше 45 мин)	Мутация фактора V Лейдена	Острая травма спин. Мозга (менее 1 мес)
Беременность или послеродовой период	Постельный режим (более 72 ч)	Волчаночный антикоагулянт	Множественные травмы (менее 1 мес)
Необъяснимый или спонтанный аборт в анамнезе ( невынашивание в анамнезе)	Иммобилизация гипсовой повязкой ( или ортопедический аппарат)	Антикардиолипиновые антитела	
Оральные контрацептивы или заместительная гормональная терапия	Катетеризация центральной вены	Повышенный уровень гомоцистеина	
Сепсис ( менее 1 мес)	Онкология	Гепарин- индуцированная тромбоцитопения	
Болезни легких, включая пневмонию ( за менее 1 мес)		Другие врожденные или приобретенные тромбофилии	
Заболевания легких (нарушение функции дыхания)			
Острый инфаркт миокарда			
Застойная сердечная недостаточность ( за менее 1 мес)			
Воспалительные заболевания кишечника в анамнезе			
Пациент на постельном режиме			
Варикозное расширение вен			

Врач: Фамилия И.О.