

 <b>ГАУЗ</b> <b>«КДМЦ»</b>	<b>«Камский детский медицинский центр»</b>  <b>Эпидемиологический отдел</b>	<i>СОП-010-16-23</i>
		2 листа
		Редакция № 1

**Стандартная операционная процедура:  
 постановка диагноза «ИСМП. Послеродовая инфекция» пациентам  
 ГАУЗ "Камский детский медицинский центр".**

	должность	Ф.И.О.	подпись
<b>утвердил</b>	Главный врач		
<b>разработал</b>	Врач-эпидемиолог		
<b>введен</b>	19.08.2016 г.		
<b>отменен</b>			
<b>рассылка</b>	Заведующей эпидемиологическим отделом		
<b>изменение</b>			
<b>место хранения</b>	Эпидемиологический отдел, 9/09, кабинет № 13, папка алгоритмов		
<b>количество экземпляров</b>	1		
<b>согласование</b>	должность	ФИО	подпись
	Зав. эпидемиологическим отделом		
	Заместитель главного врача по родовспоможению		
	Заместитель главного врача по педиатрической помощи		

**I. Цель внедрения.**

Стандартизация диагностики ИСМП послеродовой инфекции у пациентов ГАУЗ «КДМЦ», для дифференцировки от аутоинфицирования и полноценного статистического учета.

## II. ИСМП эндометрит – при подтверждении возможности заноса инфекции.

### III. Стандартное определение случая ИСМП, послеродовая инфекция

2.1. **Эндометрит** должен определяться на основании одного из двух критериев:

- a) выделение культуры микроорганизма из жидкости в полости матки или ткани эндометрия (слизистой оболочки матки), полученных во время хирургической операции, при аспирации иглой или при выскабливании;
- b) гнойные выделения из матки,

а также наличие двух из таких признаков, как лихорадка ( $>38^{\circ}\text{C}$ ), боли в животе, болезненность при пальпации матки.

2.2. **Инфекция наружных половых органов** должна определяться на основании одного из двух критериев:

- a) гнойные выделения из наружных половых органов;
- b) наличие абсцесса наружных половых органов.

2.3. **Инфекция влагалища** должна определяться на основании одного из трех критериев:

- a) гнойные выделения из влагалища
- b) наличие абсцесса влагалища;
- c) выделение культуры патогенного микроорганизма из жидкости или ткани, полученных из влагалища.

2.4. **Другие инфекции женских половых органов** (яичника, влагалища, матки или других глубоких тканей таза), исключая эндометрит и инфекцию шейки матки, должны определяться на основании одного из трех критериев:

- a) выделение культуры микроорганизма из ткани или жидкости пораженного места;
- b) наличие абсцесса или других проявлений инфекции, обнаруженных во время хирургической операции или при патогистологическом исследовании;
- c) наличие двух из таких признаков, как лихорадка ( $>38^{\circ}\text{C}$ ), тошнота, рвота, боль, болезненность при пальпации или дизурия,

а также хотя бы одного из следующего:

- выделение гемокультуры микроорганизма;
- диагноз врача.